

Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

| Impfung | Alter in Wochen | Alter in Monaten | | | | | Alter in Jahren | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|----|-------|--------------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 6 | 2 | 3 | 4 | 11–14 | 15–23 | 2–4 | 5–6 | 7–8 | 9–14 | 15–16 | 17 | ab 18 | ab 60 | |
| Rotaviren | G1 ^b | G2 | (G3) | | | | | | | | | | | | |
| Tetanus | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | N | A1 | N | A2 | N | A (ggf. N) ^e | | | |
| Diphtherie | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | N | A1 | N | A2 | N | A (ggf. N) ^e | | | |
| Pertussis | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | N | A1 | N | A2 | N | A3 ^e | ggf. N | | |
| Hib <i>H. influenzae</i> Typ b | | G1 | G2 ^c | G3 | G4 | N | N | | | | | | | | |
| Poliomyelitis | | G1 | G2 ^c | G3 | G4 | N | N | | | A1 | N | ggf. N | | | |
| Hepatitis B | | G1 | G2 ^c | G3 | G4 | N | N | | | | | | | | |
| Pneumokokken ^a | | G1 | | G2 | G3 | N | | | | | | | S ^g | | |
| Meningokokken C | | | | | | G1 (ab 12 Monaten) | | N | | | | | | | |
| Masern | | | | | | G1 | G2 | N | | | | | S ^f | | |
| Mumps, Röteln | | | | | | G1 | G2 | N | | | | | | | |
| Varizellen | | | | | | G1 | G2 | N | | | | | | | |
| HPV Humane Papillomviren | | | | | | | | | G1 ^d | G2 ^d | N ^d | | | | |
| Herpes zoster | | | | | | | | | | | | | | G1 ^h | G2 ^h |
| Influenza | | | | | | | | | | | | | | S (jährlich) | |

Erläuterungen

- G Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)
- A Auffrischimpfung
- S Standardimpfung
- N Nachholimpfung (Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

- a Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.
- b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- c Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- d Standardimpfung für Kinder und Jugendliche im Alter von 9–14 Jahren mit 2 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).
- e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
- g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.
- h Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.